


QUÍMICA

TEMA 5: EQUILIBRIO QUÍMICO

- Reserva 1, Ejercicio 6, Opción A
- Reserva 2, Ejercicio 3, Opción A
- Reserva 2, Ejercicio 6, Opción B
- Reserva 3, Ejercicio 3, Opción A
- Reserva 3, Ejercicio 5, Opción B
- Reserva 4, Ejercicio 3, Opción A
- Reserva 4, Ejercicio 5, Opción B
- Septiembre, Ejercicio 3, Opción B
- Septiembre, Ejercicio 6, Opción B

Para el proceso Haber:



el valor de K_p es $1'45 \cdot 10^{-5}$, a 500°C . En una mezcla en equilibrio de los tres gases, a esa temperatura, la presión parcial de H_2 es $0'928$ atmósferas y la de N_2 es $0'432$ atmósferas.

Calcule:

a) La presión total en el equilibrio.


b) El valor de la constante K_c .

Datos: $R = 0'082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

QUÍMICA. 2008. RESERVA 1 EJERCICIO 6 OPCIÓN A

R E S O L U C I Ó N

a)



$$K_p = \frac{P_{\text{NH}_3}^2}{P_{\text{N}_2} \cdot P_{\text{H}_2}^3} \Rightarrow P_{\text{NH}_3} = \sqrt{1'45 \cdot 10^{-5} \cdot 0'432 \cdot (0'928)^3} = 2'23 \cdot 10^{-3} \text{ atm}$$

$$P_T = P_{\text{NH}_3} + P_{\text{N}_2} + P_{\text{H}_2} = 2'23 \cdot 10^{-3} + 0'432 + 0'928 = 1'362 \text{ atm}$$

b)

$$K_c = K_p \cdot (RT)^{-\Delta n} = 1'45 \cdot 10^{-5} \cdot (0'082 \cdot 773)^2 = 0'058 \text{ mol}^{-2} \cdot \text{L}^2$$

Al calentar cloruro de amonio en un recipiente cerrado se establece el siguiente equilibrio:



Justifique cómo afectará a la posición del equilibrio:

- a) Una disminución de la presión total.
- b) La extracción de amoniaco del recipiente.
- c) La adición de NH_4Cl sólido.


QUÍMICA. 2008. RESERVA 2 EJERCICIO 3. OPCIÓN A

R E S O L U C I Ó N

El principio de Le Chatelier establece que si un sistema en equilibrio es perturbado mediante una acción exterior, este sistema evoluciona para contrarrestar dicha perturbación, llegando a un nuevo estado de equilibrio.

- a) Si se disminuye la presión total, el volumen debe aumentar, luego el equilibrio se desplaza hacia la derecha.
- b) Si se extrae amoniaco, el equilibrio se desplaza hacia la derecha.
- c) No ocurre nada, ya que el cloruro amónico es sólido y no altera el cociente de reacción.

El óxido de mercurio (II) contenido en un recipiente cerrado se descompone a 380°C según:



Sabiendo que a esa temperatura el valor de K_p es 0'186, calcule:

- Las presiones parciales de O_2 y de Hg en el equilibrio.
- La presión total en el equilibrio y el valor de K_c a esa temperatura.

Dato: $R = 0'082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

QUÍMICA. 2008. RESERVA 2 EJERCICIO 6. OPCIÓN B

R E S O L U C I Ó N

a) Como el óxido de mercurio se encuentra en estado sólido, entonces: $K_p = P_{\text{Hg}}^2 \cdot P_{\text{O}_2}$.

Como en el equilibrio hay doble número de moles de mercurio que de oxígeno, la presión del mercurio será el doble, luego:

$$K_p = (2P_{\text{O}_2})^2 \cdot P_{\text{O}_2} = 4P_{\text{O}_2}^3 \Rightarrow P_{\text{O}_2} = \sqrt[3]{\frac{K_p}{4}} = \sqrt[3]{\frac{0'186}{4}} = 0'36 \text{ atm}$$



$$P_{\text{Hg}} = 2 \cdot P_{\text{O}_2} = 2 \cdot 0'36 = 0'72 \text{ atm}$$

b)

$$P_T = P_{\text{Hg}} + P_{\text{O}_2} = 0'72 + 0'36 = 1'08 \text{ atm}$$

$$K_c = K_p \cdot (RT)^{-\Delta n} = 0'186 \cdot (0'082 \cdot 653)^{-3} = 1'21 \cdot 10^{-6} \text{ mol}^3 \cdot \text{L}^{-3}$$

Escriba las expresiones de las constantes K_c y K_p y establezca la relación entre ambas para los siguientes equilibrios:



QUÍMICA. 2008. RESERVA 3 EJERCICIO 3. OPCIÓN A

R E S O L U C I Ó N

a) Para el equilibrio: $\text{CO(g)} + \text{Cl}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{COCl}_2\text{(g)}$

$$K_c = \frac{[\text{COCl}_2]}{[\text{CO}] \cdot [\text{Cl}_2]}$$

$$K_p = \frac{P_{\text{COCl}_2}}{P_{\text{CO}} \cdot P_{\text{Cl}_2}}$$

$$K_c = K_p \cdot (\text{RT})^{-\Delta n} = K_p \cdot (\text{RT})^1$$


b) Para el equilibrio: $2\text{HgO(s)} \rightleftharpoons 2\text{Hg(l)} + \text{O}_2\text{(g)}$

$$K_c = [\text{O}_2]$$

$$K_p = P_{\text{O}_2}$$

$$K_c = K_p \cdot (\text{RT})^{-\Delta n} = K_p \cdot (\text{RT})^{-1}$$

En un matraz de 7'5 litros, en el que se ha practicado previamente el vacío, se introducen 0'50 moles de H_2 y 0'50 moles de I_2 y se calienta a $448^\circ C$, estableciéndose el siguiente equilibrio:



Sabiendo que el valor de K_c es 50, calcule:

a) La constante K_p a esa temperatura.

b) La presión total y el número de moles de cada sustancia presente en el equilibrio.

QUÍMICA. 2008. RESERVA 3 EJERCICIO 5. OPCIÓN B

R E S O L U C I Ó N

a) Como $\Delta n = 0 \Rightarrow K_c = K_p = 50$.

b) El valor de la presión se puede calcular con el número total de moles (que será el mismo que inicialmente por ser $\Delta n = 0$), con la ecuación de los gases ideales:

$$P_T \cdot 7'5 = 1 \cdot 0'082 \cdot 721 \Rightarrow P_T = 7'88 \text{ atm}$$

	H_2	+	I_2	\rightarrow	$2HI$
inicial	0'5		0'5		0
equilibrio	$0'5 - x$		$0'5 - x$		$2x$

$$K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2] \cdot [I_2]} = \frac{\left(\frac{2x}{7'5}\right)^2}{\left(\frac{0'5-x}{7'5}\right) \cdot \left(\frac{0'5-x}{7'5}\right)} = \frac{4x^2}{(0'5-x)^2} = 50 \Rightarrow x = 0'39$$

$$\text{moles de } H_2 = \text{moles de } I_2 = 0'5 - 0'39 = 0'11$$

$$\text{moles de } HI = 2 \cdot 0'39 = 0'78$$

Dado el equilibrio: $4\text{HCl}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + 2\text{Cl}_2(\text{g}) \quad \Delta\text{H}^0 = -115\text{kJ}$

Razone el efecto que tendrá sobre éste cada uno de los siguientes cambios:

- a) Aumentar la temperatura.
- b) Aumentar la presión total.
- c) Añadir un catalizador.

QUÍMICA. 2008. RESERVA 4. EJERCICIO 3. OPCIÓN A

R E S O L U C I Ó N

El principio de Le Chatelier dice: “Si un sistema en equilibrio es perturbado mediante una acción exterior, este sistema evoluciona para contrarrestar dicha perturbación, llegando a un nuevo estado de equilibrio”.

- a) Un aumento de la temperatura desplazará la reacción en el sentido en que se consuma calor, es decir, en sentido endotérmico. Luego, se desplazará hacia la izquierda produciéndose más cloruro de hidrógeno y oxígeno.
- b) Si se aumenta la presión total, el equilibrio tratará de compensar este aumento desplazándose hacia donde menos moles de sustancias gaseosas existan. Es decir, hacia la derecha.
- c) Si se realiza la reacción en presencia de un catalizador se conseguirá que ésta transcurra más rápidamente pero no desplazará el equilibrio en ningún sentido.

Dado el equilibrio: $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$

Si la concentración inicial de HI es 0'1 M y cuando se alcanza el equilibrio, a 520°C, la concentración de H_2 es 0'01 M, calcule:


a) La concentración de I_2 y de HI en el equilibrio.

b) El valor de las constantes K_c y K_p a esa temperatura.

QUÍMICA. 2008. RESERVA 4. EJERCICIO 5. OPCIÓN B

R E S O L U C I Ó N

a)



La concentración en el equilibrio de $[\text{H}_2] = x = 0'01$, luego:

$$[\text{HI}] = 0'1 - 2 \cdot 0'01 = 0'08$$

$$[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 0'01$$

b)

$$K_c = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2} = \frac{(0'01) \cdot (0'01)}{(0'08)^2} = 0'0156$$

Como $\Delta n = 0 \Rightarrow K_c = K_p = 0'0156$.

A una hipotética reacción química, $A + B \rightarrow C$, le corresponde la siguiente ecuación de velocidad: $v = k \cdot [A] \cdot [B]$. Indique:

a) El orden de la reacción respecto de A.

b) El orden total de la reacción.

c) Las unidades de la constante de velocidad.

QUÍMICA. 2008. SEPTIEMBRE. EJERCICIO 3. OPCIÓN B

R E S O L U C I Ó N


a) El orden de la reacción respecto al reactivo A es el exponente al que está elevada la concentración del reactivo A en la ecuación de velocidad, es decir, 1.

b) El orden total de la reacción es la suma de los exponentes a los que están elevadas las concentraciones de los reactivos en la ecuación de velocidad, es decir, 2.

c)

$$k = \frac{v}{[A] \cdot [B]} = \frac{\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}}{\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}} = \text{mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$$

En un recipiente de 200 mL de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío, se introducen 0'40 g de N_2O_4 . Se cierra el recipiente, se calienta a $45^\circ C$ y se establece el siguiente equilibrio:



Sabiendo que a esa temperatura el N_2O_4 se ha disociado un 41'6%, calcule:

a) El valor de la constante K_c .


b) El valor de la constante K_p .

Dato: $R = 0'082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$. Masas atómicas: $N = 14$; $O = 16$

QUÍMICA. 2008. SEPTIEMBRE. EJERCICIO 6. OPCIÓN B

R E S O L U C I Ó N

a)



moles totales en el equilibrio: $n(1+\alpha)$

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = \frac{\left(\frac{2n\alpha}{v}\right)^2}{\frac{n(1-\alpha)}{v}} = \frac{4n\alpha^2}{v(1-\alpha)} = \frac{4 \cdot \frac{0'40}{92} \cdot (0'416)^2}{0'2(1-0'416)} = 0'025 \text{ mol/L}$$

b)

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n} = 0'025 \cdot (0'082 \cdot 318)^1 = 0'65 \text{ atm}$$